

NODULES SUBSOLIDES: SCANNER INITIAL

Dépistage négatif

Risque très faible
Verre dépoli < 3cm ET
volume solide < 100mm³
(diamètre < 6mm)

M

Risque faible
 $100\text{mm}^3 \leq \text{volume solide} < 250\text{mm}^3$
(6mm ≤ diamètre < 8mm)

M

Risque intermédiaire
 $250\text{mm}^3 \leq \text{volume solide} < 500\text{mm}^3$
(8mm ≤ diamètre < 10mm)

M

Risque élevé
Volume solide ≥ 500mm³
(diamètre ≥ 10mm)

Scanner FD à 3 mois

Scanner FD à 1 mois

Scanner FD à 6 mois

TDV
≥ 250j

croissance

régression

croissance

stable/
croissance

Scanner FD à
12 mois

TDV
≥ 400j
ou régression

croissance

TDV < 400j

croissance

≤ 5mm

TDV ≥ 500j

Δ diamètre

> 5mm

croissance

Explorations
supplémentaires

RCP

FD: faible dose, TDV: temps de doublement de volume, j: jours

Si critère de malignité « M »: passage à la catégorie supérieure (spicules, distorsion scissurale/pleurale, concavité, composante kystique, interruption bronchique, composante en verre dépoli > 3 cm)