

SÉMIOLOGIE DE BASE DES PID: CAS CLINIQUES

L.Cassagnes

Journée de printemps de la SIT

29 mai 2015



Séméiologie des PID


- ◎ 1- Détermination des lésions élémentaires
 - Images linéaires septales / non septales
 - Images nodulaires
 - Verre dépoli/ condensations
 - Image kystiques
 - Rayon de miel sous pleural
 - Distorsion architecturale
 - Bronchectasies par traction
- ◎ 2- Topographie.




Démarche diagnostique





- Identification des lésions élémentaires.
 - Distribution de ces lésions élémentaires, retentissement sur l'architecture pulmonaire éventuelles lésions associées.
 - Evolutivité temporelle
- > permet diagnostic ou gamme diagnostique oriente vers LBA ou biopsie pulmonaire.

CAS N°1

- ⊙ Patient insuffisant cardiaque connu
- ⊙ Hospitalisation en urgence pour dyspnée d'aggravation progressive.







Lésions :

Épaississements septaux


Plages de verre dépoli

Distribution:

Centrale

Atteinte apex et bases




OAP (PID aiguë)




Cas n°2 :



- Patient de 70 ans
- Atcds d'IDM, Rao serré, tabagisme sévéré
- Asthénie sans fièvre
- CRP à 100 mg/l
- EFR : trouble ventilatoire restrictif


TDM Janvier







TDM mars






janvier



mars




Lésions:


Condensations alvéolaires avec bronchogramme
Signe du halo inversé

Distribution :

Périphérique


Condensations migratrices





3 mois + tard
(après corticoïdes)

**COP (cryptogenic organizing pneumonia) =
PO (pneumopathie organisée) =
ancienne BOOP**





PO :



condensations parenchymateuses avec bronchogramme,
opacités linéaires, gradient apico-basal

Disposition sous pleurale,

Multifocal, bilatéral, migratrices

Signe du halo inversé








What Every Radiologist Should Know about Idiopathic Interstitial Pneumonias¹


*Christina Mueller-Mang, MD • Claudia Grosse, MD • Katharina Schmid,
MD • Leopold Stiebellemer, MD • Alexander A. Bankier, MD*

RadioGraphics 2007; 27:595–615

Cas n°3 :

- Patiente de 50 ans
- Dyspnée progressive
- Toux sèche
- Crépitants à l'auscultation
- Syndrome restrictif aux EFR









Lésions:

Rayon de miel prédominant

Réticulations

Pas de verre dépoli


Distribution :

Prédominance sous pleurale



Distribution:
Gradient apico-basal

**FPI (fibrose pulmonaire idiopathique) =
UIP (usual interstitial pneumonia) =
PIC (pneumopathie interstitielle commune)**






What Every Radiologist Should Know about Idiopathic Interstitial Pneumonias¹




*Christina Mueller-Mang, MD • Claudia Grosse, MD • Katharina Schmid,
MD • Leopold Stiebellehmer, MD • Alexander A. Bankier, MD*



RadioGraphics 2007; 27:595–615


Cas n° 4:

- Patiente de 55 ans
- Dyspnée avec toux faiblement productive
- Asthénie et perte de poids
- Râles crépitants à l'auscultation










Lésions:



hyperdensités en verre dépoli
Réticulations intra et inter lobulaires
Bronchectasies de traction
Pas de rayon de miel

Distribution:

Topographie sous pleurale
Pas de gradient

**PINS (pneumopathie interstitielle non spécifique) =
NSIP (non specific interstitial pneumonia)**





What Every Radiologist Should Know about Idiopathic Interstitial Pneumonias¹

*Christina Mueller-Mang, MD • Claudia Grosse, MD • Katharina Schmid,
MD • Leopold Stiebellehmer, MD • Alexander A. Bankier, MD*

RadioGraphics 2007; 27:595–615

The diagram consists of a horizontal double-headed arrow at the top. The left arrow is black and labeled 'UIP', pointing left. The right arrow is grey and labeled 'NSIP', pointing right. Below the arrow are four horizontal bands, each representing a different radiographic feature. Each band is a wedge that tapers from left to right. The left side of each band is black and contains a feature name. The right side is grey and contains a corresponding radiographic finding. The features and findings are: 1. Obvious apico-basal gradient (black) / No obvious gradient (grey); 2. Heterogeneous (black) / Homogeneous (grey); 3. Honeycombing (black) / Ground-glass opacities (grey); 4. Traction bronchiectasis (black) / Micronodules (grey).

UIP

NSIP

No obvious gradient

Obvious apico-basal gradient

Homogeneous


Heterogeneous

Ground-glass opacities

Honeycombing



Micronodules


Traction bronchiectasis



Cas N°5 :

- ⦿ Jeune patient de 32 ans
- ⦿ Gros fumeur
- ⦿ TDM pour recherche de lésions pulmonaires
- ⦿ Discrète asthénie






Lésions:




Syndrôme micro nodulaire flou
De faible densité
Verre dépoli multifocal

Topographie:

centro-lobulaire
Gradient baso-apical



**RB-ILB (respiratory bronchiolitis
Interstitial lung disease)**





What Every Radiologist Should Know about Idiopathic Interstitial Pneumonias¹

*Christina Mueller-Mang, MD • Claudia Grosse, MD • Katharina Schmid,
MD • Leopold Stiebellehmer, MD • Alexander A. Bankier, MD*


RadioGraphics 2007; 27:595–615

Cas N°6 :

- ⦿ Patient de 65 ans
- ⦿ Porteur d'un syndrome de Sjögren
- ⦿ **Dyspnée progressive**



000
.32
0



Lésions:

Kystes


Verre dépoli diffus

Nodules centro-lobulaires


Distribution :

Diffuse


LIP (lymphoïd interstitial pneumonia)



a.





b.




c.

Cas n°7 :

- Patient de 60 ans
- Hospitalisé pour pneumopathie hypoxémiante d'origine infectieuse
- Asthénie +++
- Fièvre à 39°
- CRP à 540 mg/l
- EFR : trouble ventilatoire restrictif





Lésions :

Opacités bilatérales (VD, condensations),
homogènes,
bronchogramme
Épanchements pleuraux discrets
Cœur normal

Distribution :

Bilatérales
Gravitationnelles
confluentes





SDRA=

AIP (acute interstitial pneumonia=




DAD (diffuse alveolar damage) histologie



Cas n°8 :

- Patient de 60 ans
- Ancien fumeur
- Dyspnée importante
- CRP à 540 mg/l
- EFR : subnormale



250 mm





Lésions:

Emphysème

Rayon de miel

Bronchectasies de traction

Distribution:

Emphysème aux apex

Fibrose aux bases

Syndrome emphysème/fibrose

conclusion

- ◎ **Le compte rendu radiologique :**
 - Description séméiologique des lésions,
 - leur distribution,
 - évolutivité temporelle,
 - site préférentiel de biopsie,
 - dilatation des cavités cardiaques ?
- ◎ PIC formelle / possible / exclue ou autre orientation diagnostique
- ◎ Importance du contexte clinique +++
- ◎ Toujours penser à éliminer une pathologie médicamenteuse +++